

VERTISSEMENTS GRICOLES

EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

000161
S.R.P.V.

13, ROUTE DE LA FORET

86580 BIARD

Bulletin n° 338 (04/97) 12 Février 1997

COLZA	: Traitements charançon de la tige
BLE	: Maladies, premières tendances

Stade C1. **COLZA**

CHARANCONS DE LA TIGE

Situation

Les captures se sont intensifiées sur l'ensemble de la région entre les 7 et 10 février.

A ce jour, 200 captures sur 20 cuvettes ont été enregistrées. Le vol est actuellement interrompu, suite aux mauvaises conditions climatiques. Les femelles ne sont pas aptes à pondre mais le deviendront assez vite (températures douces).

A noter le caractère **important** du vol cette année.

Préconisation

Prévoyez votre traitement à partir du début de la **semaine prochaine** dès que vous aurez une journée favorable à l'activité des insectes.

CEREALES

RISQUE MOYEN

PIETIN VERSE

Prévision - situation

Deux nouvelles contaminations primaires sont intervenues depuis la mi-janvier.

Le risque climatique reste légèrement plus faible qu'en 1996 mais le retard concernant le début possible des contaminations secondaires se réduit (températures douces). L'inoculum abondant de la campagne 1995 revient en surface.

Le tableau ci-après vous aidera à déterminer le risque parcellaire pour 1997 et les parcelles justifiant d'un traitement.

Date de semis		Type de sol		Précédents	
Avant le 25/10	+ 6	Sol limoneux	+ 5	Blé en 96	+ 4
Du 25/10 au 15/11	+ 3	Groies séchantes	+ 1	Blé en 95	+ 3
				Blé en 94	+ 1
				Blé en 96 et 95	+ 5
Après le 15/11	+ 1	Sol de marais	0	Blé en 96 et 94	+ 4
		Autres types de sols	+ 3	Blé en 95 et 94	+ 4
NOTE 1		NOTE 2		NOTE 3	

Note globale = Note 1 + Note 2 + Note 3

Note supérieure à 13 = risque élevé

Note de 11 à 13 = risque moyen

Note de 7 à 10 = risque limité

Note inférieure à 7 = risque très faible

D340 J 40830



P 30

Préconisation

La climatologie des 3-4 semaines à venir pourrait conduire à modifier ces premières indications, le niveau des températures étant très variable selon les années (voir 1995 et 1996).

- Note supérieure à 13 :

Un traitement anti-piétin est à prévoir. Dans le cas du prochloraz, son positionnement avant le stade 1 noeud est improbable à ce jour.

- Note de 11 à 13 :

La stratégie de lutte sera établie de façon globale (pied-feuilles).

- Note inférieure à 11 :

Les maladies foliaires seront à considérer en priorité.

RISQUE MOYEN A FAIBLE

ROUILLE BRUNE

Situation - Prévision

Comme en 1996, le risque rouille se situe à un **niveau faible** sauf dans les parcelles levées vers les 20-25 octobre en zone atlantique (risque moyen) ; la période anormalement froide fin décembre - début janvier a maintenu ce risque à un faible niveau.

Sur variétés sensibles en terres de groies, le risque probable d'explosion de la maladie se situe de fin gonflement à début épiaison dans les Charentes et de mi-épiaison à floraison en Vienne - Deux-Sèvres.

Rappelons que l'effet sol est le suivant : très favorable pour les groies, favorable pour les aubues et champagnes ; peu favorable pour les limons et les marais.

RISQUE NON EVALUABLE A CE JOUR

Pour la septoriose sur blé et la rhynchosporiose sur orge, il est prématuré de se prononcer sur l'évolution ultérieure de ces maladies.